

## リウマチ性疾患診療患者名簿

患者番号	施設名	性別	年代	診断名	主な治療法 (画一的でなく、症例毎に個別的に記載)
1	リウマチ財団病院 リウマチセンター	男 ・ 女	50 歳代	RA	セレコキシブ 200mg メトトレキサート 6 mg/週 フォリアミン 5mg/週 人工膝関節置換術
2	ザイダン クリニック	男 ・ 女	30 歳代	RA	メトトレキサート 4 mg 2×週1回 フォリアミン 5mg/週 トシリズマブ 162mg/2週
3	リウマチ財団病院 整形外科	男 ・ 女	60 歳代	OA(膝)	体重減量 大腿四頭筋訓練 高位脛骨骨切り術
4	ザイダン クリニック	男 ・ 女	40 歳代	RA	メトトレキサート 6 mg/週 プレドニゾロン 5 mg インフリキシマブ 3 mg/kg/8週
5	リウマチ財団病院 内科	男 ・ 女	60 歳代	抗好中球細胞質 抗体関連血管炎	ステロイドパルス療法 メチルプレドニゾロン 500 mg/日×3 3コース実施 サイクロフォスファミドパルス療法 750 mg/m <sup>2</sup> 以後2か月ごとに実施
6	リウマチ財団病院 リウマチセンター	男 ・ 女	30 歳代	SLE	プレドニゾロン 66 mg 初期投与 ミゾリビン 150 mg 併用 アザチオプリン 50 mgに変更
7	リウマチ財団病院 整形外科	男 ・ 女	20 歳代	高安動脈炎	ステロイドパルス療法 メチルプレドニゾロン 500 mg/日×3 を3コース メトトレキサート 6 mg/週

8	リウマチ内科医院	男 ・ 女	40 歳代	痛風	インドメタシン除放剤 75mg ランソプラゾール 15mg コルヒチン 0.5mg/頓用 アロプリノール 100mg、発作消褪後服用開始 節酒指導
9	リウマチ内科医院	男 ・ 女	60 歳代	偽痛風	ロキソプロフェン 180mg ランソプラゾール 15mg 関節穿刺・トリアムシノロン アセトニド 20 mg 関注
10	リウマチ財団病院 リウマチ外来	男 ・ 女	30 歳代	強直性脊椎炎	ジクロフェナック除放剤 75mg サラゾスルファピリジン 1000mg アダリマブ 40mg/2週 皮下注

申請者氏名 財団 医太郎

※同一施設内において、他の申請者と同一症例を担当した場合であっても、対象患者とすることは可能です。  
ただし、その場合は、自身が担当した内容について個別性をもって記載してください。他の申請者と同一内容  
の記載は認められません。

※本申請に記載可能な略語は、次の通りです。下記以外の病名や薬物名の略語の使用はできませんので、下記以  
外の略語を使う場合は、初出箇所に full spelling と略語を記載し、以降は略語で記載して頂いて結構です。  
(例：治療薬としてはMTX にトファシチニブ(TOF)を追加した。TOF 併用により・・・)

#### 【病名】

- OA：変形性関節症 (osteoarthritis)
- RA：関節リウマチ (rheumatoid arthritis)
- SLE：全身性エリテマトーデス (systemic lupus erythematosus)

【薬物名】「日本リウマチ学会リウマチ学用語・WEB 検索」 (<https://www.ryumachi-jp.com/yougo/search.php>) 参照

- ・副腎皮質ステロイド (グルココルチコイド)
  - PSL：プレドニゾロン
- ・従来型抗リウマチ薬 (csDMARDs)
  - BUC：ブシラミン
  - LEF：レフルノミド
  - MTX：メトトレキサート
  - SASP：サラゾスルファピリジン
  - TAC：タクロリムス
- ・生物学的製剤 (bDMARDs)
  - ABT：アバタセプト
  - ADA：アダリムマブ
  - CZP：セルトリズマブ ペゴル
  - ETN：エタネルセプト
  - GLM：ゴリムマブ
  - IFX：インフリキシマブ
  - TCZ：トシリズマブ