

リウマチ性疾患診療患者名簿

患者 番号	施 設 名	性別	年代	診断名	主 な 治 療 法 (画一的でなく、症例毎に個別的に記載)
1	リウマチ財団病院 リウマチセンター	♂ ・ ♀	50 歳代	RA	セレコキシブ 200mg メトトレキサート 6 mg/週 フォリアミン 5mg/週 人工膝関節置換術
2	ザイダン クリニック	男 ・ ♀	30 歳代	RA	メトトレキサート 4 mg 2×週1回 フォリアミン 5mg/週 トシリズマブ 162mg/2週
3	リウマチ財団病院 整形外科	男 ・ ♀	60 歳代	OA(膝)	体重減量 大腿四頭筋訓練 高位脛骨骨切り術
4	ザイダン クリニック	男 ・ ♀	40 歳代	RA	メトトレキサート 6 mg/週 プレドニゾロン 5 mg インフリキシマブ 3 mg/kg/8週
5	リウマチ財団病院 内科	♂ ・ ♀	60 歳代	抗好中球細胞質 抗体関連血管炎	ステロイドパルス療法 メチルプレドニゾロン 500 mg/日×3 3コース実施 サイクロフォスファミドパルス療法 750 mg/m ² 以後2か月ごとに実施
6	リウマチ財団病院 リウマチセンター	男 ・ ♀	30 歳代	SLE	プレドニゾロン 66 mg 初期投与 ミゾリビン 150 mg 併用 アザチオプリン 50 mgに変更
7	リウマチ財団病院 整形外科	男 ・ ♀	20 歳代	高安動脈炎	ステロイドパルス療法 メチルプレドニゾロン 500 mg/日×3 を3コース メトトレキサート 6 mg/週

8	リウマチ内科医院	⑧ ・ 女	40 歳代	痛風	インドメタシン除放剤 75mg ランソプラゾール 15mg コルヒチン 0.5mg/頓用 アロプリノール 100mg、発作消褪後服用開始 節酒指導
9	リウマチ内科医院	男 ・ ⑨	60 歳代	偽痛風	ロキソプロフェン 180mg ランソプラゾール 15mg 関節穿刺・トリアムシノロン アセトニド 20 mg 関注
10	リウマチ財団病院 リウマチ外来	⑩ ・ 女	30 歳代	強直性脊椎炎	ジクロフェナック除放剤 75mg サラゾスルフ アピリジン 1000mg アダリマブ 40mg/2 週 皮下注

申請者氏名 財団 医太郎

※同一施設内において、他の申請者と同一症例を担当した場合であっても、対象患者とすることは可能です。
ただし、その場合は、自身が担当した内容について個別性をもって記載してください。他の申請者と同一内容
の記載は認められません。

※本申請に記載可能な略語は、次の通りです。下記以外の病名や薬物名の略語の使用はできませんので、下記以
外の略語を使う場合は、初出箇所に full spelling と略語を記載し、以降は略語で記載して頂いて結構です。
(例：治療薬としては MTX にトファシチニブ (TOF) を追加した。TOF 併用により・・・)

【病名】

OA：変形性関節症 (osteoarthritis)
PMR：リウマチ性多発筋痛症 (polymyalgia rheumatica)
RA：関節リウマチ (rheumatoid arthritis)
SLE：全身性エリテマトーデス (systemic lupus erythematosus)

【薬物名】「日本リウマチ学会リウマチ学用語・WEB 検索」(<https://www.ryumachi-jp.com/yougo/search.php>) 参照

- ・副腎皮質ステロイド (グルココルチコイド)
 - PSL：プレドニゾロン
- ・従来型抗リウマチ薬 (csDMARDs)
 - BUC：ブシラミン
 - IGU：イグラチモド
 - LEF：レフルノミド
 - MTX：メトトレキサート
 - MTX SC：メトトレキサート皮下注射
 - SASP：サラゾスルファピリジン
 - TAC：タクロリムス
- ・JAK 阻害薬
 - BAR：バリシチニブ
 - FIL：フィルゴチニブ
 - PEF：ペフィシチニブ
 - TOF：トファシチニブ
 - UPA：ウパダシチニブ
- ・生物学的製剤 (bDMARDs)
 - ABT：アバタセプト
 - ADA：アダリムマブ
 - CZP：セルトリズマブ ペゴル
 - ETN：エタネルセプト
 - GLM：ゴリムマブ
 - IFX：インフリキシマブ
 - OZR：オゾラリズマブ
 - SAR：サリルマブ
 - TCZ：トシリズマブ
- ・バイオシミラー (BS)
 - ADA BS：アダリムマブバイオシミラー
 - ETN BS：エタネルセプトバイオシミラー
 - IFX BS：インフリキシマブバイオシミラー